

مقاله پژوهشی اصیل

مقایسه تاثیر بسته آموزشی "تصویری"، "نوشتاری"، و "تصویری نوشتاری" مراحل اسکن قلب بر همکاری بیماران

زهرا اسدی^۱، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی* مریم اسماعیلی نسب^۲، دکترای روان شناسیناهد یعقوبی^۳، متخصص پزشکی هسته ایعلی انصاری فر^۴، کارشناس ارشد مدیریت پرستاری بهداشت جامعه

خلاصه

هدف. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر بسته آموزشی مراحل اسکن قلب به صورت تصویری (فیلم)، نوشتاری (کتابچه)، و نیز تصویری نوشتاری (فیلم و کتابچه) بر همکاری بیماران بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی بود.

زمینه. بیماری عروق کرونر از شایع ترین علل مرگ و میر در جهان است. یکی از راه های تشخیص بیماری عروق کرونر اسکن پرفیوژن میوکارد می باشد. عدم آشنایی بیماران با این روش تشخیصی باعث کاهش سطح همکاری بیمار در حین انجام این روش تشخیصی می شود که به نوبه خود، سبب فرسودگی و افزایش فشار کاری پرسنل بخش به علت پرسش های مکرر بیماران در مراحل مختلف اسکن قلب می شود.

روش کار. این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی ۱۰۰ نفر از مراجعه کنندگان به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی انجام گردید (۲۵ نفر در گروه کنترل، ۲۵ نفر در گروه آموزش تصویری، ۲۵ نفر در گروه آموزش نوشتاری، و ۲۵ نفر در گروه آموزش تصویری نوشتاری). ابزار گردآوری در این تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته سطح همکاری و دو بسته آموزشی تصویری و نوشتاری بود که پس از تهیه توسط محققان به صورت مجزا و در مورد یکی از گروه ها به صورت توأم به کار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کروسکال والیس و آزمون تعقیبی یو مان ویتنی استفاده گردید.

یافته ها. نتایج حاکی از آن بود که بین سطح همکاری گروه کنترل و گروه های آموزش دیده سه گانه اختلاف معنی دار وجود دارد. از بین سه روش آموزشی، روش آموزش تصویری بیشترین تاثیر را بر افزایش همکاری بیماران داشت.

نتیجه گیری. آموزش بیماران قبل از انجام اسکن پرفیوژن میوکارد بر افزایش همکاری بیماران تاثیر دارد و منجر به نتایج بهتر و اتلاف وقت کمتر بیماران و پرسنل بخش می گردد. همچنین، یافته های این مطالعه تاکید دوباره بر اهمیت توجه به مسائل روان شناختی در سلامت عمومی است.

کلیدواژه ها: بسته آموزشی، آموزش تصویری، آموزش نوشتاری، اسکن میوکارد، سطح همکاری بیمار

۱ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، کارشناس پزشکی هسته ای بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی، تهران، ایران

۲ دکترای روانشناسی، عضو هیات علمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، (نویسنده مسئول) پست الکترونیک: esmaeilinasab@modares.ac.ir

۳ عضو هیات علمی، متخصص پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

۴ کارشناس ارشد مدیریت بهداشت جامعه، سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی، تهران، ایران

مقدمه

بیماری قلب و عروق یکی از شایع ترین بیماری‌های منجر به بستری افراد بالغ در بیمارستان است (لوپس، ۲۰۰۰). بیماری عروق کرونر سر دسته علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته است و سالانه هفت میلیون دلار هزینه درمان این بیماری می‌شود (راشل، ۲۰۱۱). بیماری‌های قلبی یکی از علل بزرگ مرگ و میر در دنیای صنعتی می‌باشد (فیس، ۲۰۰۸). سن ابتلا به این بیماری‌ها در ایران کاهش یافته و جوانان بسیاری را نیز مبتلا نموده است (نیک پژوه، ۱۳۸۸).

اسکن قلب یکی از روش‌های تشخیصی قبل از عمل جراحی بای پس عروق کرونر جهت ارزیابی زنده بودن بافت قلب، و همچنین وسعت، شدت و محل ایسکمی می‌باشد (هنکین، ۲۰۰۶). این تست، غیر تهاجمی است و در آن، با دادن ورزش با تردمیل یا تنش دارویی، همراه با تزریق ماده رادیواکتیو تغییرات عملکردی و فیزیولوژی که در جریان خون عضله قلب ایجاد می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد (ایل و گامب هیر، ۲۰۰۴). این تست برای بیمار ایجاد نگرانی می‌کند و این مسئله، همکاری وی را کاهش می‌دهد و همچنین، باعث کم شدن کیفیت تصویربرداری می‌گردد (نایتینگل، ۲۰۱۲). عدم شناخت، باعث پایین آمدن سطح همکاری بیمار در حین انجام این روش تشخیصی می‌شود که خود، عامل فرسودگی و افزایش بار و زمان کاری پرسنل به علت پرسش‌های مکرر بیماران در مراحل مختلف اسکن قلب می‌باشد. پرسنل بخش‌های مختلف درمانی و تشخیصی می‌توانند تدابیر و اقدامات لازم نظیر آشنا ساختن بیمار با محیط، و ارائه آموزش‌های لازم قبل از هر اقدام را انجام دهند که نقش مهمی در افزایش سطح همکاری آنان خواهد داشت (زارت، ۲۰۱۰).

امروزه آموزش یکی از فعالیت‌های اساسی در امر سلامت به شمار می‌رود و به عنوان فعالیتی در جهت خدمت به جامعه مطرح می‌شود تا بتواند افراد و جامعه را به سوی حفظ و ارتقاء سطح سلامت سوق دهد و موجب سازگاری فرد در هر شرایطی شود (آزاد، ۱۳۹۱). در آموزش به بیمار ترکیبی از روش‌های مختلف یاددهی و تکنیک‌های اصلاح رفتار به کار می‌رود که بر رفتار بهداشتی بیمار اثر دارد (تلان، ۲۰۰۸). تاثیر ارائه اطلاعات به بیمار و آموزش آن‌ها بر کاهش اضطراب، ترس و افزایش تحمل بیماران قبل از جراحی و پروسیجرهای تهاجمی و غیر تهاجمی در بسیاری از مطالعات مورد تأیید قرار گرفته است. ارائه اطلاعات به بیماران در آنها این حس را ایجاد می‌کند که به خوبی مورد توجه و مراقبت قرار گرفته اند و بر این اساس، سازگاری بهتری با فرایند انجام آزمایش دارند و برای همکاری بیشتر آماده می‌باشند. همچنین، با ارائه اطلاعات به بیماران، آنان نه تنها خود را کنترل می‌کنند، بلکه به گونه ای مفید با پرستاران ارتباط برقرار می‌نمایند (لارکین و زیریچ کو، ۲۰۰۰؛ دهداری و همکاران، ۱۳۸۶؛ کلون، ۲۰۰۱؛ بلچک و مک کلسکی، ۲۰۰۳). استفاده از نوارهای ویدئویی از طریق نشان دادن نمونه های زنده واقعی به بیماران وسیله ای ارزشمند در شناخت آنها از اقدامات بالینی و چگونگی مراقبت از خود بوده است (سیلوا، ۲۰۰۱).

با دادن اطلاعات کافی و ایجاد آرامش می‌توان بیمار را در تحمل ترس‌های ناشی از موقعیت‌های ناآشنا کمک کرد (کاپلان، ۲۰۱۰؛ پاتریک کالانگان، ۲۰۰۱). در یک مطالعه تجربی که به منظور بررسی مقایسه تأثیر آموزش ویدئویی و نوشتاری در بیماران سرپایی چینی در واحد بهداشت روان دانشگاه هنگ کنگ انجام گرفت، گروهی که از طریق ویدئو آموزش دیده بودند وضعیت بهتری داشتند. با وجود اهمیت این موضوع و اقدامات مشابه در داخل و خارج از کشور، در ایران تاکنون چنین بسته آموزشی جهت اسکن قلب تهیه نشده است. هدف این مطالعه مقایسه تأثیر بسته آموزشی مراحل اسکن قلب به صورت تصویری (فیلم)، نوشتاری (کتابچه)، و نیز تصویری نوشتاری (فیلم و کتابچه) بر همکاری بیماران بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی بود.

مواد و روش‌ها

این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود که در مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران انجام شد. جامعه مورد مطالعه، مراجعه کنندگان به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قلب شهید رجایی جهت انجام اسکن قلب بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند بر اساس معیارهای ورود به مطالعه (سن ۱۸ تا ۸۰ سال، درک زبان فارسی، تحصیلات ششم ابتدایی و بالاتر) و معیارهای حذف (اعضای کادر پزشکی و پیراپزشکی، سابقه انجام اسکن قلب، و ابتلا به بیماری روانی شناخته شده) انجام شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بود که پس از تعیین حجم نمونه (۱۰۰ نفر)، افراد به طور مساوی به تعداد ۲۵ بیمار در هر گروه قرار گرفتند.

بسته آموزشی "مراحل اسکن قلب" شامل سی دی تصویری از کلیه مراحل اسکن قلب (پذیرش؛ نوبت دهی؛ ریکاوری؛ انجام تست ورزش یا در صورت عدم ناتوانی فرد در انجام تست ورزش، تنش دارویی؛ مرحله تصویربرداری با دوربین گاما به صورت SPECT) تهیه شد. در بسته آموزش نوشتاری نیز همین مراحل به صورت کتابچه تهیه شد.

پرسشنامه محقق ساخته بررسی همکاری بیمار شامل پنج سوال از مراحل مختلف اسکن قلب، و پاسخ ها از نوع مقیاس لیکرت چهار درجه ای از ۱ تا ۴ به (همکاری ضعیف، متوسط، خوب، خیلی خوب) بود. سوالات پرسشنامه در جدول شماره ۱ آمده است. جهت بررسی اعتبار محتوایی پرسشنامه، پس از تدوین سوالات، از دو متخصص روان شناس، دو متخصص پزشکی هسته ای و سه نفر از پرسنل خواسته شد تا در مورد آن اعلام نظر کنند و پیشنهادات آنها در اصلاح پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت.

پس از اخذ مجوز اخلاقی و اجرایی از مسئولین مرکز و تایید موضوع طرح پژوهشی از واحد پژوهش و مسئولین بیمارستان و بخش پزشکی هسته ای، پژوهشگر مرحله عملیاتی تحقیق را شروع کرد. دریافت معرفی نامه کتبی از واحد حراست بیمارستان جهت تهیه فیلم آموزشی در بخش پزشکی هسته ای مرحله بعدی فرایند انجام تحقیق بود. به بیمارانی که جهت گرفتن نوبت به بخش مراجعه می کردند ابتدا پرسشنامه مشخصات فردی داده شد و پس از اطمینان از داشتن شرایط جهت شرکت در طرح پژوهشی و اخذ رضایت آنان، نمونه ها به طور تصادفی در یکی از گروه های چهارگانه قرار گرفتند. به ۲۵ نفر از نمونه ها، آموزش تصویری داده شد، ۲۵ نفر از نمونه ها تحت آموزش نوشتاری قرار گرفتند، ۲۵ نفر از نمونه ها آموزش توأم تصویری و نوشتاری دریافت کردند، و ۲۵ نفر از نمونه ها بدون آموزش به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. افراد تحت مطالعه در فاصله بین اولین مراجعه، یعنی روز نوبت گیری تا روز انجام اسکن، منابع آموزشی در دسترس را مورد استفاده قرار دادند. در روز انجام اسکن، پرسشنامه سطح همکاری بر روی پاکت پذیرش بیمار که در مراحل مختلف انجام اسکن در اختیار همکاران قرار دارد نصب شد. سپس سطح همکاری بیمار مورد نظر در مراحل مختلف اسکن قلب، توسط پرسنل مسئول آن قسمت سنجیده شد. همکارانی که این ارزیابی را انجام می دادند درباره اینکه بیمار مورد نظر در کدام یک از گروه های تحقیق قرار دارد اطلاعی نداشتند.

جدول شماره ۱: گویه های پرسشنامه سطح همکاری به همراه مقیاس اندازه گیری

ردیف	سطح همکاری بیمار	ضعیف	متوسط	خوب	بسیار خوب
۱	در مرحله آمادگی اولیه				
۲	در مرحله ریکاوری				
۳	در مرحله انجام تست ورزش				
۴	در مرحله تصویربرداری SPECT				
۵	در مرحله تصویربرداری LAT				

یافته ها

ویژگی های فردی (سن، جنس، وضعیت تاهل و ...) نمونه ها در جدول شماره ۲ نشان داده شده است. از آنجا که در این پژوهش بیش از دو گروه مقایسه وجود دارد، از دو آزمون تحلیل کواریانس یا کروسکال والیس می توان استفاده نمود، با توجه به این که متغیر سطح همکاری از نوع رتبه ای است و در ضمن بیش از دو گروه مورد مقایسه قرار می گیرد، از آزمون جایگزین یعنی کروسکال والیس برای بررسی تفاوت در چهار گروه در متغیر سطح همکاری استفاده شد. چون این آزمون تفاوت دو به دو بین گروه ها را نشان نمی دهد، پس از انجام آن، به منظور بررسی دو به دو گروه ها از آزمون تعقیبی یو مان ویتنی استفاده شد. با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره ۳، آماره کای دو برای بررسی چهارگروه برابر ۵۱/۱۳۹ می باشد که با درجه آزادی ۳ در سطح خطای کوچکتر از ۰/۰۵ معنادار است. بنابراین، بین چهار گروه از نظر سطح همکاری تفاوت معنی دار وجود دارد. به منظور بررسی دو به دو گروهها از آزمون یومان ویتنی استفاده شد.

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی مطلق و نسبی ویژگی دموگرافیک واحدهای پژوهش در چهار گروه کنترل، آموزش نوشتاری، آموزش تصویری، و آموزش توام

گروه	آزمون	آموزش تصویری	آموزش نوشتاری	آموزش توام
متغیر	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)
جنس				
مرد	(۴۸)۱۲	(۴۰)۱۰	(۴۴)۱۱	(۵۲)۱۳
زن	(۵۲)۱۳	(۶۰)۱۵	(۵۶)۱۴	(۴۸)۱۲
وضعیت تاهل				
مجرد	(۰)۰	(۴)۱	(۴)۱	(۸)۲
متاهل	(۹۶)۲۴	(۸۴)۲۱	(۸۸)۲۲	(۸۰)۲۰
همسر فوت شده	(۴)۱	(۸)۲	(۴)۱	(۸)۲
همسر جداشده	(۰)۰	(۴)۱	(۴)۱	(۴)۱
سن (سال)				
۲۰-۴۰	(۱۲)۳	(۰)۰	(۸)۲	(۱۲)۳
۴۱-۵۰	(۲۰)۵	(۲۴)۶	(۳۶)۹	(۲۰)۵
۵۱-۶۰	(۴۸)۱۲	(۲۸)۷	(۲۸)۷	(۴۴)۱۱
بیشتر از ۶۰ سال	(۲۰)۵	(۴۸)۱۲	(۲۸)۷	(۲۴)۶
تحصیلات				
ابتدایی تا دیپلم	(۷۲)۱۸	(۶۰)۱۵	(۶۸)۱۷	(۶۴)۱۶
فوق دیپلم	(۱۶)۴	(۱۶)۴	(۸)۲	(۴)۱
لیسانس	(۱۲)۳	(۲۰)۵	(۱۲)۳	(۱۶)۴
فوق لیسانس و بالاتر	(۰)۰	(۴)۱	(۱۲)۳	(۱۶)۴
محل سکونت				
تهران	(۶۰)۱۵	(۶۰)۱۵	(۷۲)۱۸	(۹۲)۲۳
مرکز استان	(۱۲)۳	(۲۴)۶	(۸)۲	(۰)۰
شهرهای دیگر	(۲۰)۵	(۱۲)۳	(۱۶)۴	(۴)۱
روستا	(۸)۲	(۴)۱	(۴)۱	(۴)۱

همان گونه که در جدول ۴ مشاهده می گردد، تفاوت میانگین رتبه های گروه آموزش توام با گروه گواه در سطح خطای کمتر از ۰/۰۵ معنادار است. بنابراین، با اطمینان ۰/۹۵ می توان بیان داشت که آموزش توام (نوشتاری-تصویری) در افزایش سطح همکاری بیماران موثر است. در ضمن، تفاوت میانگین رتبه های گروه آموزش توام با گروه آموزش تصویری در سطح خطای کمتر از ۰/۰۴۵ معنادار است. بنابراین، با اطمینان بیش از ۰/۹۵ می توان بیان داشت که آموزش تصویری نسبت به آموزش توام (نوشتاری-

تصویری) در افزایش سطح همکاری بیماران موثرتر است. همچنین، تفاوت میانگین رتبه های گروه آموزش نوشتاری و توام با گروه گواه در سطح خطای کوچکتر از ۰/۳۵ معنادار است. با توجه به این که سطح خطای این آماره بزرگتر از ۰/۰۵ است، بنابراین، با اطمینان بیش از ۰/۹۵ می توان بیان داشت که بین آموزش توام (نوشتاری- تصویری) و آموزش نوشتاری در افزایش سطح همکاری بیماران تفاوت معنادار وجود ندارد.

جدول شماره ۳: نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی تفاوت در چهار گروه در متغیر سطح همکاری

مقدار p	درجه آزادی	آماره کای دو کروسکال والیس	میانگین رتبه ها	گروه
			۱۷/۴۲	کنترل
۰/۰۰۰	۳	۵۱/۱۳۹	۷۰/۰۴	آموزش تصویری
			۵۰/۵۲	آموزش نوشتاری
			۶۴/۰۲	آموزش توام

جدول شماره ۴: نتایج آزمون یو مان ویتنی برای بررسی تفاوت دو به دوی گروه ها

مقدار p	آماره Z یومان ویتنی	گروه J	گروه I
۰/۰۰۰	۵/۹۰	آموزش با تصویری	گروه کنترل
۰/۰۰۰	۴/۷۳	آموزش نوشتاری	
۰/۰۰۰	۵/۵۷	آموزش توام	
۰/۰۰۴	۲/۸۵	آموزش نوشتاری	گروه آموزش تصویری
۰/۰۴۵	۲/۰۰۳	آموزش توام	
۰/۳۵۵	۰/۹۲۵	آموزش توام	گروه آموزش نوشتاری

بحث

اسکن قلب معمول ترین روش تصویر برداری در تشخیص بیماری عروق کرونری قلب در بیمارانی است که با درد قفسه سینه یا علائمی که به نظر می رسد ناشی از ایسکمی باشند مراجعه کرده اند. با توجه به این که اکثر بیماران اطلاعات کمی از مراحل انجام آن دارند، به شدت دچار اضطراب می شوند و همکاری خوبی با پرسنل ندارند و این سبب خستگی کارکنان می گردد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، اثر آموزش مراحل این اسکن، به شیوه نوشتاری و تصویری و کاربرد آنها به تنهایی و توام (نوشتاری-تصویری) بر افزایش سطح همکاری بیماران به طور معناداری موثر بود. این موضوع نشان می دهد که وقتی بیماران درباره اقداماتی که قرار است برای آنها انجام شود بدانند، از اضطراب آنها کاسته می شود و همکاری آنها بیشتر می گردد (فیبس، ۲۰۰۸). در ضمن، این یافته ها مطابق با سایر پژوهش ها در زمینه اقدامات تشخیصی و درمانی دیگر است (اصیلیولی و کرلیک، ۲۰۰۴؛ ممبینی، ۱۳۸۵). اما یافته قابل تامل بیشتر در این پژوهش این است که آموزش تصویری بیش از دو روش نوشتاری و توام بر افزایش سطح همکاری بیماران اثر دارد. همان طور که گفته شد، این بیماران دچار اضطراب زیادی در رابطه با اقدام تشخیصی هستند و به همین دلیل امکان تمرکز بر یک نوشته برای شان دشوار است، در حالی که تصویر ضمن نیاز به تمرکز کمتر، حاوی اطلاعات گویاتری می باشد و این می تواند موید اثربخشی بیشتر روش تصویری نسبت به نوشتاری باشد. در روش توام نوشتاری-تصویری، فرد آموزش لازم را در قالب تصویری می گیرد و آنچه به صورت نوشته همزمان به او ارائه می گردد فاقد ارزش عملکردی است و خود به خستگی بیشتر او می انجامد. این یافته که در مورد میزان آموزش های داده شده محدودیت هایی وجود دارد با مطالعات سیلوا (۲۰۰۱) و بران (۲۰۰۰) همسو است. چون ارائه اطلاعات به شیوه تصویری بدون نیاز به توجه و خواندن، اطلاعات لازم را برای فرد فراهم می کند.

نتیجه گیری

بیماران و مددجویان بهتر است در ارتباط با مراقبت و سلامت خود آگاهی کافی داشته باشند. افراد حق دارند در فرایند بهبودی و حفظ سلامتی خویش شرکت داشته باشند. تأمین بهبودی از طریق افزایش آگاهی امکان پذیر می باشد که این هدف جز به وسیله آموزش قابل دستیابی نمی باشد. اکثر انسان ها تمایل دارند درباره موقعیت خود و روش های درمانی که برای آنان به کار می رود اطلاعات کافی داشته باشند، زیرا با داشتن دانش کافی می توانند عهده دار مسئولیت سلامت و مراقبت از خود شوند. این آگاهی ها در ابتدا اضطراب و ترس آنها را از فرایند درمان کاهش می دهد، و به تبع آن، میزان همکاری آنها را در فرایند درمان افزایش می یابد. عدم آشنایی بیماران نسبت به این روش تشخیصی اسکن قلب مانند دیگر اقدامات بیمارستانی موجب پایین آمدن سطح همکاری بیمار در حین انجام این روش تشخیصی می شود که خود عامل فرسودگی و افزایش بار کاری پرسنل بخش های مربوطه به علت پرسش های مکرر بیماران در مراحل مختلف اسکن قلب می باشد. از آنجا که به کارگیری این گونه روش ها در قبال اثرات مفید آن هزینه زیادی ندارد و از نظر کاربرد، بسیار آسان و عملی می باشد، بنابراین، بخش های تشخیصی و درمانی بهتر است مشابه چنین بسته آموزشی را تهیه کنند و در اختیار بیماران قرار دهند.

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی مرکز، ریاست و مدیریت محترم مرکز، ریاست و معاونت و کلیه همکاران بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی که در این طرح پژوهشی ما را یاری نمودند کمال تقدیر و تشکر را داریم.

منابع فارسی

- آزاد ح، ۱۳۹۱، آسیب شناسی روانی. انتشارات بعثت.
- دهداری ط، ۱۳۸۶، طراحی و ارزشیابی نظری و برنامه آموزشی به منظور شناسایی اضطراب بیماران بعد از جراحی بایپس قلبی در مرکز قلب تهران. پایان نامه دکتری آموزش سلامت. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- سادوک ب. سادوک و، ۲۰۱۰. دستنامه روان پزشکی بالینی کاپلان سادوک. مترجم: دکتر محسن ارجمند، انتشارات ارجمند
- ممینی ل. ۱۳۸۵، مقایسه بین اثر آموزش با فیلم و آموزش پامفلت در اضطراب آشکار در بیماران در لیست انتظار برای پیوند عروق کرونر در مرکز قلب تهران. پایان نامه دکترا. دانشگاه پزشکی ایران. دانشکده پرستاری. ۶-۷.
- مومنی ح، ۱۳۸۵، مقایسه تاثیر آموزش با دو روش تصویری و کتابچه ای بر اضطراب بیماران قبل از عمل پیوند عروق کرونر. مرکز قلب تهران
- نیک پژوه، ۱۳۸۸، راهنمای پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق تهران. موسسه پیشگیری و ارتقای سلامت ایران.

منابع انگلیسی

- Asilloglu, K., & Celik, S. (2004). The effect of preoperative education on anxiety of open cardiac surgery patient. *Patient Education and Counseling*, 53, 62-70.
- Bran, T. (2000). Teaching strategies for critical thinking. *Nurse Educator*, 16, 16-22.
- Colin, R. (2001). Nursing management of the patient with stress. *Health Psychology* 19, 80-83.
- Dankner, R., Geulayov, G., Ziv, A., Novikov, I., & Drory, Y. (2011). The effect of an education intervention on coronary artery bypass graft surgery patients participation rate in cardiac rehabilitation programs: A controlled health care trial. *Bio Med. BMC cardio Vass disorder*, 2261;11-60
- Garvin, B., Moser, DK., Riegel B., McKinley S., & Doering L, An K. (2003). Effects of gender and preference for information and control on anxiety early after myocardial infarction. *Nurse Res* .52, 97-386
- Henkin, R E; Bova D; Dillehay, GL; Karesh, S M; Halama, J R. (2006). *Nuclear Medicine*, Baltimor, Mosby 2th edition.
- Larkins ,D.(2000) .; Sex Difference in cardiovascular anxiety. *American Journal of Nursing*.65-17:663 ,
- Lewis. SH; Hertknper, M; Dirkson, S. (2000). *Medical-Surgical Nursing*. Mosby. Fifth edition: 805-815.
- Nightingale, JM; Murphy, FJ. Blakeley, C. (2012). I thought it was just an x-ray: a qualitative investigation of patient experiences in cardiac SPECT-CT imaging. *Nucl Med Commun*, 33(3): 246-54.
- Callaghan, P; Chan, H C. (2001). The effect of videotaped or written information on Chinese gastro copy patients' clinical outcomes. *Patient Education and Counseling*. 42: 230-225 .

- Peter, J., Ell & Sanjid, S. (2004). Nuclear Medicine in clinical diagnosis and treatment. ED in Burgh, Churchill Livingstone. Volume 2.
- Phipp, S. (2008). Medical surgical nursing. East and African, 8th edition.
- Silva, E. (2001). Nursing concepts of stress adaptation. Rehabilitation Nursing. 18: 25-28.
- Thelan, LA.; Darid, JU; Linda N. (2008). Text book of critical care nursing (Diagnosis and Management). Philadelphia: Mosby.
- Zaret, BL; & Beller, GA. (2010). Clinical nuclear cardiology. State of the art and future direction Mosby.

Original Article

Comparison of the effect of written, figurative and written-figurative training package of myocardial perfusion imaging on patients' cooperation**Zahra Asadi¹, MSc*****Maryam Esmaeilinasab², Ph.D****Nahid Yaghobi³, Nuclear Medicine Specialist****Ali Ansarifar⁴, MSc****Abstract**

Aim. The aim of this study was to compare the effect of written, figurative and written-figurative training package of myocardial perfusion imaging (MPI) on patients' cooperation in the nuclear medicine department of Rajaie Heart Hospital.

Background. Coronary artery disease (CAD) is one of the most common causes of death all over the world and MPI is a well-known diagnostic method for CAD. However, not knowing about the procedure makes the patients anxious and reduces their cooperation and causes personnel of the department to experience fatigue and workload.

Method. A quasi-experimental design was used to conduct the study. One hundred patients, referred to the nuclear medicine department of Rajaie Heart Hospital, Tehran, Iran, were randomly assigned in four groups (25 in the control group, 25 in written training group, 25 in figurative training group, and 25 in combined training group). Two questionnaires were provided including demographics, and a researcher-made questionnaire for evaluation of patients' cooperation. Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U post hoc test were used for data analysis.

Findings. A statistically significant difference was seen between cooperation level of the control group and the other three groups. Figurative training package was the most effective training package.

Conclusion. Explaining the procedure to the patients before myocardial perfusion imaging is a significant action to improve their cooperation, leading to less time waste and better results.

Keywords: Written and figurative training package, Myocardial Perfusion Imaging, Patients' cooperation

1 Master of Science in Clinical Psychology, Nuclear Medicine Department Technician, Rajaie Heart Hospital, Tehran, Iran

2 Doctor of Philosophy in Psychology, Faculty Member of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

(*Corresponding Author) email: esmaeilinasab@modares.ac.ir

3 Associate Professor, Department of Nuclear Medicine, Rajaie Heart Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Master of Science in Public Health Nursing Management, Supervisor For Health Education Department, Rajaie Heart Hospital, Tehran, Iran